



CONDUITE à TENIR en cas de PIQÛRE(S) D'ABEILLES

CONSEILS GENERAUX

- 1 - **Bien désinfecter** avec de l'eau et du savon, et avec les lingettes appropriées
Oter les bagues en cas de piqûre à la main
- 2- **Retirer le plus rapidement possible et avec précaution le dard de l'abeille** (grattage avec l'ongle, bord non tranchant d'un couteau, carte de crédit)
- 2 - Appliquer de la **glace enveloppée dans un tissu sur la zone de piqûre.**

+ I - APPARITION D'UNE REACTION LOCALE :

- rougeur
- douleur
- œdème
- prurit (démangeaisons)

Prendre un comprimé de Clarityne, attendre $\frac{1}{2}$ heure, en compagnie d'un collègue

+ II - SI LES SYMPTÔMES S'AMPLIFIENT

- Diffusion de la rougeur et du gonflement au-delà du point de piqûre
- Gêne respiratoire
- Mettre la victime au repos
- Appeler le 15

+ III - SI D'EMBLEE MALAISE

- Sueurs
- Pâleur, nausées, vomissements
- Gêne respiratoire
- Coucher la victime en position latérale de sécurité

C'est une urgence extrême, appeler le 15

Faire une injection d'anapen face externe cuisse.

+ IV - SI PIQÛRES MULTIPLES

- Piqûre dans la bouche, dans la gorge, donner 1 glaçon à sucer

C'est une urgence extrême, appeler le 15

Allongez la personne en position latérale de sécurité en attendant les secours.